



# Commencer le traitement par Repatha<sup>MD</sup> (évolocumab)



## Réponses aux questions fréquemment posées

### Qu'est-ce que Repatha<sup>MD</sup>?

Repatha<sup>MD</sup> (évolocumab) est un médicament qui aide à réduire le taux de **cholestérol**. Le cholestérol est l'une des substances grasses présentes dans la circulation sanguine. Le taux de **cholestérol total** reflète principalement la quantité de **cholestérol des lipoprotéines de faible densité (C-LDL)**, souvent appelé « mauvais » cholestérol, et de **cholestérol des lipoprotéines de haute densité (C-HDL)**, ou « bon » cholestérol.

Le **C-LDL** peut s'accumuler dans les parois des artères et former une plaque pouvant causer un rétrécissement des artères, ce qui ralentit ou empêche la circulation du sang jusqu'aux organes vitaux tels que le cœur et le cerveau. Cet obstacle à la circulation du sang peut provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, en plus de causer d'autres problèmes de santé. Le **C-HDL** aide à prévenir l'accumulation du mauvais cholestérol dans les artères et protège ainsi contre les maladies du cœur. Les **triglycérides**, une autre forme de substance grasse présente dans la circulation sanguine, jouent un rôle important dans l'organisme, mais ils peuvent augmenter le risque de maladies du cœur si leur taux est trop élevé.

### Pourquoi m'a-t-on prescrit Repatha<sup>MD</sup>?

Repatha<sup>MD</sup> est utilisé en association avec un régime alimentaire et le traitement habituel (y compris les statines, des médicaments servant à abaisser le taux de cholestérol) pour réduire le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou de certaines interventions cardiaques (visant à rétablir la circulation du sang au cœur) chez les patients adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire.

Repatha<sup>MD</sup> est aussi utilisé seul ou avec d'autres médicaments servant à abaisser le taux de cholestérol, en association avec un régime alimentaire, chez les adultes atteints d'hyperlipidémie primaire (taux élevé de cholestérol dans le sang) afin de réduire le taux de **C-LDL**.

Durant le traitement par Repatha<sup>MD</sup>, vous devriez poursuivre votre régime qui aide à réduire votre taux de cholestérol.

### Comment Repatha<sup>MD</sup> agit-il?

L'évolocumab, l'ingrédient actif de Repatha<sup>MD</sup>, agit en aidant le foie à **réduire** les taux de cholestérol total, de **C-LDL** et de **triglycérides** dans le sang. De plus, Repatha<sup>MD</sup> **augmente** le taux de **C-HDL**.

### Comment dois-je prendre Repatha<sup>MD</sup>?

Repatha<sup>MD</sup> est administré sous la forme d'une injection sous la peau (injection sous-cutanée). Vous pouvez prendre Repatha<sup>MD</sup> **toutes les deux semaines** avec l'auto-injecteur prérempli à usage unique (SureClick<sup>MD</sup>) contenant une dose de 140 mg/mL ou **une fois par mois** avec le minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup> contenant une dose de 420 mg/mL.

Il est important de ne pas tenter de vous injecter Repatha<sup>MD</sup> vous-même avant d'avoir reçu la formation d'un professionnel de la santé sur la bonne façon d'utiliser l'auto-injecteur SureClick ou le minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup>.

Si le médecin vous a prescrit Repatha<sup>MD</sup> en association avec une statine ou un autre médicament servant à réduire le taux de cholestérol, suivez

les instructions du médecin concernant la manière de prendre ces médicaments ensemble.

**Les étapes à suivre pour effectuer l'injection à l'aide de l'auto-injecteur SureClick et du minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup> sont décrites dans le feuillet Renseignements destinés au patient inséré dans l'emballage de Repatha<sup>MD</sup>.**

### Quelle est la dose habituelle de Repatha<sup>MD</sup>?

**Prévention des événements cardiovasculaires et hyperlipidémie primaire :**

#### Auto-injecteur SureClick :

La dose habituelle de Repatha<sup>MD</sup> est de 140 mg toutes les deux semaines – un auto-injecteur prérempli SureClick de 1 mL.

*OU*

#### Minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup> :

La dose habituelle de Repatha<sup>MD</sup> est de 420 mg une fois par mois – une cartouche préremplie de 3,5 mL avec minidoseur automatique.

### Repatha<sup>MD</sup> cause-t-il des effets secondaires?

Les effets secondaires possibles sont les suivants :

Grippe ou symptômes rappelant les symptômes de la grippe (forte fièvre, mal de gorge, écoulement nasal, toux et frissons) Douleur aux articulations (arthralgie)

Rhume, comme un écoulement nasal, un mal de gorge ou une infection des sinus (rhinopharyngite ou infection des voies respiratoires supérieures) Taux élevé de sucre dans le sang (diabète)

Nausées Réactions au point d'injection (rougeur, ecchymose, douleur, enflure ou saignement)

Douleur au dos Réactions allergiques, y compris l'éruption cutanée, l'urticaire, de petits boutons rouges accompagnés de démangeaisons et, dans de rares cas, l'enflure du visage, de la bouche, de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke)

Si vous présentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.



# Repatha<sup>MD</sup> est offert sous les formes posologiques suivantes

Repatha<sup>MD</sup> est administré par une injection sous la peau (injection sous-cutanée). Vous pouvez prendre Repatha<sup>MD</sup> toutes les deux semaines ou une fois par mois, selon votre méthode préférée déterminée en consultation avec votre médecin.

## Auto-injecteur SureClick

Repatha<sup>MD</sup> peut être administré avec l'auto-injecteur SureClick. La dose recommandée de Repatha<sup>MD</sup> avec l'auto-injecteur SureClick est une injection (140 mg) toutes les deux semaines. L'injection prend environ 15 secondes.



## Minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup>

Repatha<sup>MD</sup> peut également être administré à l'aide du minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup>. La dose recommandée de Repatha<sup>MD</sup> avec le minidoseur automatique est une injection (420 mg) une fois par mois. L'injection prend environ 9 minutes.



## REPÈRE Repatha<sup>MD</sup>

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATIENTS

VOTRE PARTENAIRE DE SOINS, SUR TOUTE LA LIGNE

Le programme de soutien aux patients REPÈRE Repatha<sup>MD</sup> (offert par les services de soutien aux patients AMGEN Entrust<sup>MC</sup>)\* vous offre un soutien personnalisé pour vous aider à démarrer et à poursuivre votre traitement par Repatha<sup>MD</sup>.

- Aide pour obtenir une couverture d'assurance
- Formation sur l'utilisation de l'auto-injecteur SureClick ou du minidoseur automatique Repatha<sup>MD</sup>
- Ressources éducatives sur Repatha<sup>MD</sup> et sur la santé cardiovasculaire
- Soutien d'une infirmière, contact personnalisé continu et service de rappels des injections

**POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, COMPOSEZ LE 1-888-REPATHA (1-888-737-2842).**

## Vous avez des questions?

Veuillez consulter le feuillet **Renseignements destinés au patient** inséré dans l'emballage de votre médicament pour obtenir de l'information complète ou appelez la ligne d'information sans frais du programme de soutien aux patients REPÈRE Repatha<sup>MD</sup> au 1-888-Repatha (1-888-737-2842) ou consultez le site Repatha.ca (DIN pour l'auto-injecteur SureClick : 02446057; DIN pour le minidoseur automatique : 02459779).

**Le programme de soutien aux patients REPÈRE Repatha<sup>MD</sup> est là pour vous aider. Appelez au 1-888-Repatha (1-888-737-2842) ou visitez Repatha.ca.**

Repatha<sup>MD</sup> ne doit pas être utilisé si vous avez déjà eu une réaction allergique à Repatha<sup>MD</sup> ou à n'importe lequel des ingrédients de Repatha<sup>MD</sup>.

Repatha<sup>MD</sup> n'a pas fait l'objet d'études chez la femme enceinte; il n'a pas été établi si Repatha<sup>MD</sup> peut, ou non, avoir des effets néfastes sur l'enfant à naître. Si vous souhaitez devenir enceinte ou pensez l'être pendant le traitement par Repatha<sup>MD</sup>, dites-le à votre médecin. Si vous prenez également une statine en même temps que Repatha<sup>MD</sup>, cessez de prendre Repatha<sup>MD</sup> et lisez le feuillet d'information fourni dans l'emballage de la statine que vous prenez avec Repatha<sup>MD</sup>. Il n'a pas été établi si, oui ou non, Repatha<sup>MD</sup> passe dans le lait maternel.

Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez Repatha<sup>MD</sup>, parlez à votre professionnel de la santé au sujet de votre inscription au registre de l'exposition à Repatha<sup>MD</sup> pendant la grossesse. Vous pouvez vous inscrire au registre en composant le 1-877-311-8972 ou en visitant le site <https://mothertobaby.org/ongoing-study/repatha/> (en anglais). Ce registre a pour but de recueillir de l'information sur l'innocuité de Repatha<sup>MD</sup> pendant la grossesse.

Pour essayer d'éviter les effets secondaires et pour assurer une utilisation appropriée du médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant de prendre Repatha<sup>MD</sup>. Informez-le de toutes vos maladies ou de tous vos problèmes de santé.

Le capuchon de l'aiguille de l'auto-injecteur prérempli à usage unique SureClick contient du caoutchouc naturel sec (latex) qui ne doit pas être manipulé par les personnes qui y sont allergiques. Le minidoseur automatique avec cartouche préremplie ne contient pas de caoutchouc naturel sec. L'utilisation de Repatha<sup>MD</sup> n'a pas été évaluée chez les enfants de moins de 18 ans qui présentent une hyperlipidémie primaire. Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels, produits de médecine douce, etc.

\* AMGEN Entrust est notre nouvelle plateforme unifiée de services de soutien aux patients, qui s'appuie sur l'acquis de nos programmes de soutien propres à chaque marque.

Référence : Monographie de Repatha<sup>MD</sup> (évolocumab). Amgen Canada Inc., 11 juin 2019.

© 2020 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.

Repatha<sup>MD</sup>, REPÈRE Repatha<sup>MD</sup> et SureClick<sup>SM</sup> sont des marques déposées d'Amgen Inc., utilisées avec autorisation. AMGEN ENTRUST<sup>SM</sup> est une marque de commerce d'Amgen Inc.



**Pour obtenir un nouveau bloc de *Réponses aux questions fréquemment posées*, veuillez communiquer avec votre représentant d'Amgen ou téléphonez au 1-888-Repatha (1-888-737-2842).**